

お求めやすい、 100_{ml}登場!



2000倍希釈で、
散布液

200_{ml}分

*作物・対象害虫によって希釈倍率は異なります。
詳しくは裏面をご覧ください。

野菜・
茶用
殺虫剤

速く効く。あの害虫^{*1}にも効く。
だから、収量に差^{*2}がつく。

グレーシア[®] 乳剤

- 有効成分フルキサメタミド配合。抵抗性コナガにも卓効
- 幅広いチョウ目害虫に効果

- 葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫も退治
- 殺虫効果は約2週間持続

*1 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧ください。 *2 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。

®は日産化学(株)の登録商標

速く効く。あの害虫にも効く。

グレーシア[®] 乳剤

農林水産省登録：第24185号 有効成分：フルキサメタミド…10.0%
 人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）
 容量：100ml入、250ml入、500ml入、5ℓ入

適用害虫と使用方法 *本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
さといも	ハダニ類	2000倍		収穫7日前まで	2回以内	散布
	ハスモンヨトウ					
かんしょ	ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、コナジラミ類、ハダニ類、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ	2000~3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布
やまのいも	ハスモンヨトウ	2000倍		収穫前日まで		
かぶ	キスジノミハムシ、コナガ	2000~3000倍	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	1回	散布
だいごん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ類、キスジノミハムシ					
キャベツ、はくさい	コナガ、アオムシ、ウワバチ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	2000~3000倍		収穫7日前まで	2回以内	散布
はなやさい類（フロクローリ、カリフラワー、茎フロクローリ）	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ウワバチ類、オオタバコガ、ハイマダラノメイガ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ					
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ、アオムシ	3000倍			1回	
レタス、非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	2000~3000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布
しそ科葉菜類（えごま(葉)を除く）	アザミウマ類	2000倍		収穫7日前まで		
しそ(花穂)	アザミウマ類	2000倍		収穫7日前まで	2回以内	散布
たまねぎ	ハモグリバエ類、アザミウマ類	2000~3000倍		収穫7日前まで		
ねぎ	ネギコガ、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、クロバネキノコバエ類	2000倍	1ℓ/m ²	収穫21日前まで	本剤：2回以内 フルキサメタミド剤：4回以内 (苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	株元灌注
	ネダニ類		-	植付時		
にら	アザミウマ類、クロバネキノコバエ類	2000倍	1ℓ/m ²	収穫14日前まで	本剤：1回 フルキサメタミド剤：2回以内 (株元灌注は1回以内、散布は1回以内)	株元灌注
				収穫7日前まで		
ヤングコーン	ハダニ類	2000~3000倍	100~300ℓ/10a		1回	
未成熟とうもろこし	ハダニ類	2000~3000倍			2回以内	散布
トマト、ミニトマト	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナジラミ類、アザミウマ類、トマトサビダニ、ハモグリバエ類、トマトキバガ	2000倍		収穫前日まで		
ピーマン及びとうがらし類	オオタバコガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布
なす	コナジラミ類、アザミウマ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類					
きゅうり	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ハダニ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類	2000~3000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布
すいか、メロン	オオタバコガ、ウリノメイガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類					
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっきょうを除く)	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類	2000~3000倍	100~500ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布
あずき	アズキノメイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類					
だいず	アザミウマ類、マメシクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ、ハダニ類	2000~3000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布
えだまめ	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類					
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハダニ類	2000倍	100~500ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布
アスパラガス	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ハダニ類、ジュウシホシクビナガハムシ					
オクラ	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	2000~3000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布
しょうが	ハスモンヨトウ					
らっきょう	ネダニ類	2000倍	1ℓ/m ²	収穫30日前まで	本剤：2回以内 フルキサメタミド剤：5回以内 (種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布は2回以内)	株元灌注
	ホモノハダニ	1000倍	-	植付前		
にんにく	チューリップサビダニ	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	本剤：2回以内 フルキサメタミド剤：2回以内 (鱗片への処理は1回、散布は1回)	散布
			-	収穫7日前まで		
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメコバエ、マダラカサハラハムシ、ヨモギエダシヤク、チャノホソガ、チャトゲコナジラミ	2000~3000倍	200~400ℓ/10a	摘採14日前まで	1回	散布
	サビダニ類、チャノホコリダニ					
いちじく	アザミウマ類	2000倍	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布
食用ぎく	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類					
きく	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類	2000倍	100~300ℓ/10a	発生初期	2回以内	散布
きく(葉)				収穫14日前まで		
りんどう	リンドウホソハマキ、ハダニ類、アザミウマ類	2000倍	-	発生初期	1回	30分間種球浸漬
ゆり	ネダニ類					

使用上の注意事項(抜粋) ●天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。●水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。

最新の製品情報は
こちら 

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2024年3月現在の登録内容に基づいています。

日産化学株式会社
 東京都中央区日本橋二丁目5番1号
 ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
 お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)