

お知らせ！

米国に加え 台湾においても、 お茶の残留基準値が 設定されました！

「台湾」輸出用の茶に
使用できるようになりました！

「フルキサメタミド(商品名:グレーシア乳剤)」の
茶での残留基準値が、台湾で設定されました。

◎対象先別のフルキサメタミド残留基準値(ppm)

対象	米国	台湾	日本
茶	5.0	5.0	6.0

速く効く。あの害虫^{*1}にも効く。
だから、収量に差^{*2}がつく。

野菜・
茶用
殺虫剤

グレーシア[®] 乳剤

- 有効成分フルキサメタミド配合。ハマキムシなどチョウ目害虫に卓効
- 殺虫効果は約2週間持続
- アザミウマ、ヨコバイ、サビダニなどの同時防除も可能

*1 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧ください。 *2 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。



速く効く。あの害虫にも効く。

グレーシア[®] 乳剤

農林水産省登録 第24185号 有効成分 フルキサメタミド…10.0% 人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 容量：100ml入、250ml入、500ml入、5ℓ入

グレーシアは、「効きの速さ」と「対象害虫の幅広さ」を兼ね備えた野菜・茶用殺虫剤です。

POINT
01

効きの速さ


害虫の口だけでなく、皮膚からも吸収されるから、作物が食べられる前に駆除できる。

POINT
02

対象害虫の幅広さ

チョウ目害虫やアザミウマ、ヨコバイ、サビダニなど幅広い害虫に卓効

お茶の主要害虫に卓効を示します。



適用害虫と使用方法(抜粋)

*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量(/10a)	使用時期	総使用回数*	使用方法
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、 チャノミドリヒメヨコバイ、マダラカサハラハムシ、ヨモギエダシヤク、 チャノホソガ、チャトゲコナジラミ	2000倍	200～400ℓ	摘採 14日前まで	1回	散布
	サビダニ類、チャノホコリダニ	2000～3000倍				

使用上の注意事項(抜粋)

●天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。●水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。



●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2024年12月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00～17:30 土日祝日除く)