

グレースシア乳剤が、
「ほうれんそう」に
使えるようになった！

大切な作物が食害される前に駆除できる。
速く効く殺虫剤・グレースシア乳剤が
「ほうれんそう」に適用拡大しました！

ホウレンソウケナガコナダニ
にも適用拡大!!

速く効く。あの害虫^{*1}にも効く。だから、収量に差^{*2}がつく。

野菜・
茶用
殺虫剤

グレースシア[®] 乳剤

- 有効成分フルキサメタミド配合 ■殺虫効果は約2週間持続
- アザミウマ類、ハスモンヨトウの同時防除が可能 ■葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫も退治



*1 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧ください。*2 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。®は日産化学(株)の登録商標

適用害虫と使用方法 使用上の注意事項(抜粋) ●天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。●水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数*		使用方法											
さといも	ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内		散布											
	ハスモンヨトウ	2000～3000倍																
かんしょ	ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、コナジラミ類、ハダニ類、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、ムツスジアシナガゾウムシ			2000倍	収穫前日まで	1回												
やまのいも	ハスモンヨトウ、ナガイモコガ、ハダニ類	2000～3000倍						2回以内										
かぶ	キスジノミハムシ、コナガ			1回														
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ類、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ	2000～3000倍			2回以内													
はつかだいこん	ハスモンヨトウ、ヨトウムシ			1回														
にんじん	コナガ、アオムシ、ウツバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	3000倍			2回以内													
結球あぶらな科葉菜類※1、はなやさい類※2	コナガ、アオムシ、アザミウマ類	2000～3000倍		2回以内														
非結球あぶらな科葉菜類	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	2000～3000倍			2回以内													
レタス、非結球レタス	シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ	2000倍		2回以内														
しゅんぎく	アザミウマ類	2000～3000倍			2回以内													
ほうれんそう	ハモグリバエ類	2000倍	2回以内															
しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く、しそ(花穂))	アザミウマ類	2000～3000倍		2回以内														
にんにく、らっきょうを除く)※3	アザミウマ類	2000～3000倍	2回以内															
ねぎ	ネギコガ、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、クロバネキノコバエ類	2000～3000倍		100～300ℓ/10a	本剤2回以内	フルキサメタミド剤:4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)	無人航空機による散布											
	ネダニ類	2000倍	1ℓ/㎡	収穫21日前まで	本剤:1回	株元灌注												
にら	アザミウマ類、クロバネキノコバエ類	2000倍	1ℓ/㎡	収穫14日前まで	本剤:1回	株元灌注												
	アザミウマ類、クロバネキノコバエ類	2000倍	100～300ℓ/10a	1回	2回以内	散布												
ヤングコーン	ハダニ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで			1回											
未成熟とうもろこし	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナジラミ類、アザミウマ類、トマトサビダニ、ハモグリバエ類、トマトキバガ	2000倍						100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内								
トマト、ミニトマト	オオタバコガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ										2000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内				
ピーマン及びとうがらし類	コナジラミ類、アザミウマ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類														2000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内
なす	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ハダニ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類																	
うり類(未成熟)※4	アザミウマ類	2000～3000倍						0.8～1.6ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内								
うり類(成熟、ただし、すいか、メロンを除く)※5	アザミウマ類										2000～3000倍	0.8～1.6ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内				
すいか、メロン	オオタバコガ、ウリノメイガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類														2000～3000倍	0.8～1.6ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっきょうを除く)	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類																	
あずき	アズキノメイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類、ハダニ類	2000～3000倍						0.8～1.6ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内								
だいず	アザミウマ類、マメシンクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ、ハダニ類										2000～3000倍	0.8～1.6ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内				
えだまめ	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類				2000～3000倍	0.8～1.6ℓ/10a									収穫14日前まで	2回以内		
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハダニ類		2000～3000倍	0.8～1.6ℓ/10a			収穫14日前まで										2回以内	
アスパラガス	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ハダニ類、ジュウシホシクビナガハムシ	2000～3000倍						0.8～1.6ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内								
オクラ	ハスモンヨトウ、オオタバコガ										2000～3000倍	0.8～1.6ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内				
しょうが	ハスモンヨトウ				2000～3000倍	0.8～1.6ℓ/10a									収穫14日前まで	2回以内		
らっきょう	ネダニ類		2000倍	1ℓ/㎡			収穫30日前まで										本剤2回以内	フルキサメタミド剤:5回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
	ホモノハダニ	1000倍	-	植付前			本剤:1回	30分間種球浸漬										
	ハモグリバエ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで			本剤2回以内	散布										
	アザミウマ類	2000～3000倍	2000倍	2000倍	2000倍	無人航空機による散布												
にんにく	ハモグリバエ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	本剤:1回	フルキサメタミド剤:2回以内(鱗片への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計1回以内)	散布											
	アザミウマ類	2000～3000倍	2000倍				無人航空機による散布											
	チューリップサビダニ	2000倍	100～300ℓ/10a				植付前	本剤:1回	120分間鱗片浸漬									
	茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、マダラカサハラハムシ、ヨモギエダシヤク、チャノホソガ、チャゲコナジラミ	2000～3000倍				200～400ℓ/10a	摘採14日前まで	1回	散布								
いちじく	アザミウマ類	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布												
食用ぎく	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類	2000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで														
きく(葉)	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類	2000倍	200～700ℓ/10a	発生初期														
りんどう	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類	2000倍	200～700ℓ/10a	収穫14日前まで														
ゆり	ネダニ類	2000～3000倍	-	植付前	1回	30分間種球浸漬												
チューリップ	チューリップサビダニ	2000倍	100～300ℓ/10a	摘花後～球根掘取り前まで	2回以内	散布												

*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。 ※1 結球あぶらな科葉菜類:キャベツ、はくさい、メキャベツ ※2 はなやさい類:ブロッコリー、カリフラワー、茎ブロッコリー ※3 鱗茎類(根物):たまねぎ、葉たまねぎ、食用ゆり、葉にんにく、のびる、ベルギーエシャロットなど ※4 うり類(未成熟):きゅうり、きゅうり(花)、ズッキーニ、ズッキーニ(花)、にがうり、赤毛ウリ、食用ひょうたん、食用へちま、しろうり、とうがん、はやとうり、ゆがお、エホバク ※5 うり類(成熟):かぼちゃ、まくわうり、漬物用まくわうり、漬物用メロン、漬物用すいか、ツノニガウリなど

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2026年3月現在の登録内容に基づいています。

最新の製品情報は
こちら



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号 ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00～17:30 土日祝日除く)